

Con la colaboración de distintos expertos en el cultivo, brindaremos un panorama preciso de cómo avanza la temporada 2025/2026 en las diferentes zonas productivas del país. En esta oportunidad les presentamos los avances al 31 de agosto de 2026.

1) REGIÓN NEA

A) Suroeste y Oeste de Corrientes – Diego Rodríguez y Diego Taiarol

- Estado fenológico de los lotes comerciales evaluados: De la totalidad de los lotes evaluados en la zona, los cultivares instalados comercialmente se encuentran en la etapa fenológica V2, con excepción de Cape Fear, del lote de cultivares de la EEA Bella Vista que se encuentra en estado fenológico V4.
- Prácticas de manejos efectuadas de los lotes comerciales evaluados: muchos aún están realizando poda. En lo referente al control de la vegetación en las interfilas y en la fila es adecuado para la condición fenológica en que se encuentra el cultivo. No se han efectuados aportes de agua para mantener la condición hídrica del suelo cercana a la capacidad de campo.
- Condiciones climáticas que predominaron en el mes de Julio (fuente: Estación meteorológica del EEA Bella Vista. Responsable: Dr. Leila Hamze)
 - Temperatura: Las mínimas oscilaron entre los 1.2 y 22.6 °C y las máximas entre 10.2 y 32.2 °C.
 - Horas Frío: Durante el mes de Julio fueron de 68 hs. Acumulando un total desde mayo de 177 hs.
 - Precipitaciones: totalizaron durante el mes 23.0 mm.
- La evapotranspiración diaria oscilo entre los 1.0 y 3.3 mm, registrándose un total para el mes de 56 mm, lo cual generó un déficit hídrico para el mismo de 33.0mm.

B) Centro Sur de Corrientes – Federico Debona

- La temporada estuvo marcada por **importantes excesos hídricos**, con precipitaciones superiores a 500 mm en algunas zonas, generando nuevos desafíos para el manejo de los suelos.
- A pesar de las condiciones climáticas, los productores avanzaron en la preparación y plantación de más de 100 hectáreas de nuevos lotes, incorporando prácticas como subsolado, camellones y diferentes métodos de laboreo.
- El Programa Nuez Pecán del Ministerio de Producción acompañó este proceso con capacitaciones en poda, nutrición, plantación y manejo de suelos, adaptadas a las condiciones de la campaña.
- Con las principales labores prácticamente finalizadas, ya se planifican nuevas capacitaciones sobre sanidad vegetal y aplicación responsable de productos fitosanitarios, fortaleciendo las herramientas técnicas de los productores frente a los desafíos climáticos.

C) Norte de Entre Ríos – Ing. Agr. Walter Silva Muller

- Se está terminando en la mayoría de los campos la poda invernal. En la mayoría de ellos se ha hecho una **poda suave dada la gran producción obtenida** durante la última campaña. Esta tarea se ha complicado y demorado por las condiciones climáticas con lluvias frecuentes, lo mismo ha sucedido con las tareas de plantación, ya sean plantaciones nuevas o reposiciones.
- Ya se han hecho aportes de enmiendas (cama de pollo, calcáreos, etc.) y se están armando los planes de fertilización y sanitarios para la próxima temporada.

D) Centro Oeste de Entre Ríos – Ing. Agr. Carolina Holzheier

- Durante agosto se alternaron jornadas grises con lloviznas, con una aparición del sol durante la última semana del mes. **La radiación es una de las variables más golpeadas en este mes de agosto**, con un período muy extenso de predominio de nubes que ya se había configurado durante el mes de julio. **La amplitud térmica ha sido baja.**
- **La recurrencia de precipitaciones dejó desvíos positivos**, con valores cercanos a 100 milímetros, el doble de lo usual. La recurrencia del tiempo húmedo y las lluvias sobreabundantes ya no deja dudas de la influencia del fenómeno de El Niño.
- Ya se han terminado las tareas de podas en la mayoría de los campos, solo queda realizar el juntado y limpieza en algunos casos de ramas.
- Se comenzaron con las **aplicaciones de cobre preventivas**, considerando lo mencionado al principio, de la temporada de lluvias que se prevén.
- Se están esparciendo abonos como cama de pollo y gallinaza, en aquellos campos con mejores accesos y campos firmes. **Todavía no hay indicios de brotación.**
- Debido a que no daban los pisos, las plantaciones están atrasadas, esperando poder arrancar durante la primera semana del mes próximo.

E) Centro Sur de Entre Ríos – Ing. Agr. Mariano Marcó

- Ya prácticamente están terminadas las tareas de poda y las aplicaciones de fitosanitarios invernales a pesar de las lluvias frecuentes que han complicado la correcta ejecución de estas tareas. Se avanza en la aplicación de enmiendas, más que nada aportes de materia orgánica a través de cama de pollo, un recurso bastante abundante en la región.
- Las nuevas plantaciones y replantes también se están ejecutando, con complicaciones, pero se llevan adelante.
- Ya **comienzan a verse indicios del inicio de la actividad fisiológica** en los montes (puntas blancas, puntas verdes en las más avanzadas) y ya comenzó la actividad y crecimiento radicular. La acumulación de horas de frío alcanza a esta

altura valores que se ubican entre 500 y 600 horas según zona con lo cual solo falta que aumente un poco la temperatura para que inicie la brotación.

- Mientras tanto se avanza en la definición de los planes nutricionales y fitosanitarios a fin de poder definir presupuestos y compras de cada proyecto.

2) **BUENOS AIRES** – Ing. Agr. Martín Basso

- La poda se encuentra finalizada en la mayoría de las plantaciones y ya se están iniciando las primeras aplicaciones de cobre pospoda.
- Hasta el momento, **no se han registrado inicios de brotación prematura** en las variedades tempranas.
- En cuanto a la comercialización, la mayoría de los productores ya ha entregado sus respectivos kilos a los empaques. Actualmente, estos se encuentran con capacidad de almacenamiento limitada debido a la sorpresiva cosecha récord registrada durante esta campaña.
- Por otro lado, **comienzan a detectarse algunos problemas de calidad** en las nueces pecán, principalmente provenientes de lotes adultos, donde se observan diferencias en el llenado y rendimiento de las nueces.
- Finalmente, las nuevas plantaciones y proyectos previstos para esta campaña ya se encuentran ejecutados, avanzando actualmente con la instalación de los sistemas de riego.

3) **CENTRO NORTE DE SANTA FE** – Ing. Agr. Nicolás Huespe

- Durante el mes de agosto, **la poda se constituyó en la principal problemática operativa de las plantaciones** de pecán de la provincia de Santa Fe. En términos generales, una proporción importante de los establecimientos no logró realizar esta labor con el nivel de avance y calidad esperado para la época.
- El retraso fue consecuencia de una combinación de factores. Por un lado, la finalización tardía de la cosecha redujo la ventana disponible para iniciar las labores invernales. Posteriormente, se registró un período aproximado de dos semanas con precipitaciones frecuentes y condiciones de elevada humedad, que dificultaron considerablemente la continuidad de los trabajos.
- Los suelos saturados o con exceso de humedad limitaron el normal desplazamiento de operarios y maquinaria dentro de las plantaciones, mientras que las precipitaciones durante las jornadas de trabajo también condicionaron directamente la ejecución de la poda. Como consecuencia, en numerosos montes la labor debió interrumpirse reiteradamente o realizarse de manera parcial.
- De esta manera, agosto finaliza con una situación poco favorable respecto del manejo de poda. Si bien existen establecimientos donde la labor pudo completarse correctamente, en una proporción importante de las plantaciones el trabajo

realizado no alcanzó el nivel esperado, convirtiéndose este aspecto en uno de los principales puntos críticos de cara al inicio del nuevo ciclo vegetativo.

- Una situación similar se registró en los proyectos de implantación. **La mayoría de las nuevas superficies correspondieron principalmente a ampliaciones o extensiones de plantaciones de pecán ya existentes**, más que a grandes proyectos completamente nuevos.
- Las precipitaciones y la elevada humedad del suelo dificultaron particularmente las labores de marcado y hoyado. Durante los últimos quince días del mes, en algunos sectores las condiciones llegaron a ser especialmente complejas, observándose situaciones en las cuales las hoyadoras extraían prácticamente barro, imposibilitando realizar una labor adecuada.
- Esta problemática presentó diferencias regionales. En el este provincial, donde predominan en numerosos sectores suelos de textura más arenosa, las dificultades operativas fueron comparativamente menores. Sin embargo, en gran parte del resto de la provincia la situación fue más compleja, especialmente en ambientes donde existe un horizonte subsuperficial con elevado contenido de arcilla y capas superficiales con importante proporción de limo. Esta combinación, bajo condiciones de elevada humedad, afecta la estructura del suelo y dificulta significativamente la correcta ejecución de las labores de hoyado.
- A pesar de estas limitaciones, la mayor parte de los proyectos de ampliación previstos logró avanzar y, en muchos casos, completar la implantación, aunque con importantes dificultades operativas. Actualmente permanecen uno o dos proyectos con superficies pendientes, evaluándose la posibilidad de continuar los trabajos en función de la evolución de las condiciones climáticas y del estado del suelo.
- A pesar de las dificultades registradas durante las labores de invierno, se observa que **la mayoría de los productores ya ha avanzado en la planificación del nuevo ciclo productivo**. En numerosos establecimientos se concretaron las compras necesarias y se organizó el stock de insumos destinado a las aplicaciones y manejos sanitarios y nutricionales de la próxima campaña.
- Este aspecto resulta particularmente importante teniendo en cuenta la proximidad del inicio de la actividad vegetativa. La **anticipación en la adquisición de insumos** permitirá afrontar las primeras etapas del ciclo con una mayor capacidad de respuesta, especialmente en aquellos lotes que deberán ajustar rápidamente sus estrategias de manejo luego de un invierno condicionado por las dificultades operativas.
- Desde el punto de vista fisiológico, **las plantaciones comienzan a mostrar signos evidentes de reactivación**. En la mayoría de las variedades ya se observan yemas hinchadas y, en numerosos ejemplares, puntas verdes, indicando que las plantas se encuentran próximas al inicio generalizado de la brotación.

- La situación actual permite prever que, de mantenerse una evolución térmica favorable, la activación vegetativa se intensificará progresivamente durante el próximo mes. Las diferencias varietales comenzarán nuevamente a expresarse con mayor claridad, particularmente entre los materiales de menor requerimiento de frío y aquellos de activación más tardía.
- En este contexto, las próximas semanas serán determinantes. La disponibilidad de humedad en los perfiles, sumada a la evolución de las temperaturas, definirá la velocidad y uniformidad del inicio de la brotación. Asimismo, será importante monitorear la evolución sanitaria de los lotes, especialmente considerando que el inicio del nuevo crecimiento vegetativo coincide con una campaña en la que las labores de poda no pudieron concretarse con la intensidad y calidad deseadas en una parte importante de las plantaciones.

4) **TUCUMÁN – CHACO – OESTE DE CÓRDOBA – JUJUY** – Ing. Agr. Enrique Orell

- **Tucumán:**
 - **Comienzo de brotación en variedades más tempranas:** Cape Fear, Shoshoni, Western, H, Súper; menos del 20% de plantas brotadas, y en las plantas brotadas por el momento la brotación es apical, después de dos días arriba de 28 grados, tuvimos mucha reacción, mucha diferencia desde el 20/8 hasta el momento, siguen frías las noches.
 - Por el momento no hay flores femeninas ni masculinas desplegándose, solo foliolos en ramas vigorosas.
- **Chaco:**
 - Avanzando **comienzo de brotación** en Cape Fear y Pawnee, comienzo en ramas apicales, muy buenas lluvias en julio y agosto, comenzamos con un **muy buen perfil**.
- **Jujuy:**
 - Comienzo de brotación, brotes de 5 cm en algunas variedades, más adelantado que en Tucumán esta semana **haremos el primer zinc**. Buen riego invernal, sin lluvias en agosto.
- **Oeste de Córdoba:**
 - Ya prácticamente terminadas las tareas de poda invernal salvo raras excepciones. **Se está regando** para cargar los perfiles de humedad y se avanza en la planificación de la próxima temporada. Se están terminando de plantar lotes nuevos, en algunos casos ampliaciones de proyectos ya existentes y en otros proyectos nuevos.

5) **SALTA** – Ing. Agr. Humberto Álvarez Sierra

- Tuvimos un **inicio de brotación semanas atrás**, en principios de agosto, cuando hubo una semana de temperaturas elevadas, luego se frenó en estas últimas semanas q tuvimos nuevamente temperaturas bajas. **Cargando los perfiles** a capacidad de campo para largar la campaña. ahora ya está avanzando la brotación en las variedades Shoshoni, Desirable y Pawnee.

Conclusiones y consideraciones finales

De acuerdo a los reportes de las distintas zonas ya se empiezan a notar los efectos de este año Niño que tendremos, con diferentes impactos según zonas. Lluvias frecuentes en el Litoral, en algunas zonas con excesos hídricos muy marcados, en otras con valores de precipitación normales para la época. Tormentas fuertes y caída de granizo en otras y también la paradoja de escasas lluvias en otras regiones.

Estas previsiones de año Niño llevan a que hay que tener muy claro cuál va ser la intensidad según la zona y prepararse para esto tanto en el manejo de los excesos hídricos como ante las condiciones de alta humedad relativa ambiente que seguramente traerá problemas respecto al manejo de enfermedades foliares, sobre todo en las zonas húmedas de nuestro país. También hay previsiones de tormentas fuertes y caída de granizo, pero localizadas y esto puede provocar problemas serios en aquellos montes que se vean afectados.

NOTA:

Agradecemos a Mariano Marcó por coordinar este trabajo y a Diego Rodríguez, Darío Taiarol, Federico Debona, Walter Silva, Nicolás Huespe, Enrique Orell, Humberto Álvarez Sierra, Martín Basso y Carolina Holzheier que colaboraron compartiendo la información de las zonas productivas donde son referentes.