

Con la colaboración de distintos expertos en el cultivo, brindaremos un panorama preciso de cómo avanza la temporada 2026/2027 en las diferentes zonas productivas del país. En esta oportunidad les presentamos los avances al 30 de septiembre de 2026.

1) CORRIENTES

A) Suroeste y Oeste de Corrientes – Diego Rodríguez y Diego Taiarol

- **Estado fenológico de los lotes comerciales evaluados:** La ruptura de la eco-dormición comenzó muy lentamente con la variedad Cape Fear los primeros días de septiembre (3/9), continuó con la Desiderable (8/9), generalizándose en todas las variedades comerciales implantadas en la zona a partir de la segunda quincena del mes.
- En la actualidad todas las variedades se encuentran en etapa vegetativa entre expansión de la hoja y foliolos expandiéndose aun en las mismas ramas. Variedades como la Cape Fear y Sesiderable se encuentra en un en una etapa reproductiva caracterizada por el desarrollo final de los amentos y aparición de los órganos femeninos.
- **Prácticas de manejos efectuadas en los lotes comerciales evaluados:** En algunos lotes, muy pocos, se realizaron las primeras aplicaciones foliares para cubrir posible deficiencia de zinc.
- Se observa un control deficiente de malezas en la línea de plantación.
- En casi todos los lotes evaluados se comenzó con el aporte de agua a través de riego, para mantener capacidad de campo y dado el estado fenológico en que se encuentran las variedades.
- **Condiciones climáticas que predominaron en el mes de agosto (fuente: Estación meteorológica del EEA Bella Vista. Responsable: Dr. Leila Hamze)**
 - **Temperatura:** Las temperaturas mínimas oscilaron entre los 5.1 y 20.3 °C y las máximas entre 12.6 y 30.8 °C. Así, la temperatura mínima fue 0.5 °C superior a la media histórica para este mes y la máxima de 1.6 °C inferior a la media histórica. La heliofanía media fue de 4.2 hs, lo que corresponde a una heliofanía relativa del 38.5 %.
 - **Horas Frío:** La acumulación de horas fríos (por debajo de los 7.2°C) durante este mes fue de 32 hs. totalizando 209 hs. en lo que va del semestre frío 2026.
 - **Precipitaciones:** Las precipitaciones acumuladas durante el mes de agosto fueron de 92.4 mm, siendo un 50.2 mm superior a la media histórica. La evapotranspiración durante el mes de agosto totalizo 90.2 mm, con valores que oscilaron entre los 0.9 y 6.6 mm/día, lo que considerando las precipitaciones acaecidas en el mes el resultado fue un balance positivo de 2.2 mm. Haciendo una comparación de las precipitaciones y la evapotranspiración ocurridas en los últimos cuatro meses, el balance es positivo en 3.2.mm promedio en la zona.

B) Centro Sur de Corrientes – Federico Debona

- Finalización de plantaciones: A mediados de septiembre se completó la implantación de los últimos lotes nuevos de pecán programados para la temporada en la provincia.
- Gestión del agua: El 100% de los lotes nuevos y existentes cuenta con sistemas de riego instalados y operativos. Debido a un déficit hídrico de 30 días consecutivos sin precipitaciones, el uso estratégico del riego fue intensivo y fundamental para garantizar el establecimiento y la supervivencia de las plantas.
- Fenología y Comportamiento del Cultivo
 - Brotación anticipada y sincrónica: La brotación comenzó a principios de mes, registrando un **adelanto fenológico** en comparación con ciclos anteriores.
 - Comportamiento atípico: Se observó una **brotación altamente sincronizada** entre las diferentes variedades en toda la región provincial, un fenómeno inusual respecto a los patrones históricos de la zona.
- Planes de manejo: Actualmente, se están ejecutando en tiempo y forma las aplicaciones correspondientes a los planes nutricionales y fitosanitarios específicos de cada monte frutal.
- Mitigación por contingencias climáticas (El Niño): Anticipándose a las previsiones del fenómeno de "El Niño" y el riesgo de excesos hídricos, numerosos productores **ejecutaron tareas de altimetría y topografía para optimizar el drenaje del terreno y prevenir anegamientos**.
- Formación técnica: En el marco del Programa Nuez Pecán, se están coordinando las próximas **capacitaciones dirigidas a aplicadores fitosanitarios** orientados específicamente al manejo de este cultivo, buscando elevar los estándares de eficiencia y seguridad en las aplicaciones.

2) ENTRE RÍOS

C) Norte de Entre Ríos – Ing. Agr. Walter Silva Muller

- Ya comenzó la brotación en las variedades más tempranas como Pawnee, Shoshoni y en menor medida Kiowa. Desirable comenzando a hinchar y el resto más atrasados. Se considera que está un poco más **atrasada la brotación que temporadas pasadas** por dos motivos básicamente: por un lado, muy pocas lluvias en Septiembre y por otro lado temperaturas muy bajas, incluso con algún registro de heladas sobre el final del mes. En lotes nuevos incluso se vio un poco de daño en brotes por estas heladas.
- Ya se están haciendo las primeras fertilizaciones, control de malezas y preparándose para las primeras aplicaciones foliares.

D) Centro Oeste de Entre Ríos – Ing. Agr. Carolina Holzheier

- El mes comenzó con bajas temperaturas, registrándose heladas; generando retrocesos en la humedad superficial. La última semana del mes, se registraron 20mm; quebrando un periodo sin precipitaciones que venía trayendo septiembre
- Durante el mes, se realizaron las ultimas plantaciones de nuevos montes de pecan, pudiendo implantarse sin problemas ya que se lograron buenas preparaciones de los terrenos, y con los sistemas de riegos funcionando a la par.
- Las variedades más precoces, ya están en plena brotación, la cual es bastante pareja. Respecto a los planes fitosanitarios para esta campaña, se han ejecutado las curas con cobre. Y se están planificando las aplicaciones de fertilizantes, que venían frenadas por la ausencia de precipitaciones. La práctica que, si se realizó, y continua, es el esparcido de gallinaza y cama de pollo.
- Actualmente, se está trabajando en el **control y manejo de malezas**, sobre todo, con controles químicos, con acción pre emergente de malezas, para lograr, un periodo más prolongado libre de malezas en las líneas de los pecanes. Siempre evaluando cada lote, sus respectivas pendientes considerando el año niño pronosticado es mejor que los suelos alcancen el momento del máximo pluvial con buena capacidad receptiva.

E) Centro Sur de Entre Ríos – Ing. Agr. Mariano Marcó

- Durante septiembre se notó fuertemente la **ausencia de lluvias** que recién quebraron la tendencia sobre el final del mes en el sur de la provincia. Septiembre fue un **mes frío**, incluso con algunas **heladas repetidas**. Si bien estas heladas no han provocado daños la conjunción de falta de lluvias y temperaturas medias bajas ha provocado un **retraso en la brotación**, se estima en una semana de retraso respecto a lo normal. Ya están en brotación Pawnee (notablemente más retrasada este año), Shoshoni, Harris Super, Cape Fear, Starking y Kiowa como más avanzadas. Desirable también a punto de brotar. El resto un poco más atrasadas. Sobre fines del mes subieron un poco las temperaturas por lo que se estima que el proceso de brotación se acelerara.
- La **acumulación de horas frío fue buena** rondando desde 500 horas más al norte hasta más de 650 en el sur provincial.
- Se han registrado **varios eventos de caída de granizo, localizado**, sin mayores daños por la etapa fenológica en que estamos salvo el último fin de semana del mes en el sur provincial donde fueron un poco más afectadas las variedades más tempranas.
- Ya se hicieron algunas **aplicaciones de zinc foliar** en lo más avanzado y se comenzaron los planes de fertilización acompañados de riegos que fue necesario hacer ante las escasas precipitaciones registradas durante Septiembre.

- Las plantaciones nuevas se pudieron hacer en tiempo y forma y la mayoría de ellas ya están brotando.

3) **BUENOS AIRES** – Ing. Agr. Martín Basso

- Fenología: **inicio de brotación, con evolución general uniforme**. Las variedades precoces presentan mayor avance, mientras que las tardías mantienen un ritmo más lento, acorde a su comportamiento varietal.
- Heladas: se registraron **heladas tardías con daños leves y localizados**, principalmente en plantaciones jóvenes de 1 a 2 años y, en menor medida, de 3 años. La mayor incidencia se observó en el oeste de la provincia.
- Sanidad y nutrición: finalizadas las aplicaciones de cobre. **Se iniciaron aplicaciones de zinc** para acompañar la elongación de brotes y la diferenciación floral.
- **Control de hormigas: requiere seguimiento intensivo, especialmente en plantaciones de 1 a 3 años**, donde el riesgo de daño sobre los brotes es mayor.
- Manejo del lote: continúa el **retiro de restos de poda**. En otros establecimientos se realiza chipeado y trozado de la madera, destinándola a retiro o utilización como cobertura sobre la línea.
- **Malezas: comienza el período crítico de control de malezas** primavera-verano, con especial atención al manejo sobre la línea para reducir la competencia hídrica y nutricional.
- Comercialización: se observa **elevado stock en el mercado interno y una disminución de los precios**, asociado a una mayor disponibilidad de nuez en el mercado.

4) **CENTRO NORTE DE SANTA FE** – Ing. Agr. Nicolás Huespe

- Durante el mes se observó el **inicio generalizado de la actividad vegetativa** en las plantaciones de la provincia. El comienzo de la brotación presentó un **comportamiento más tardío** respecto de lo observado en campañas anteriores, situación que probablemente se encuentre asociada a la persistencia de bajas temperaturas durante finales de invierno y, particularmente, a la prolongación de las temperaturas nocturnas bajas durante el inicio de la primavera.
- Las variedades de menor requerimiento de horas de frío fueron, como es habitual, las primeras en iniciar la brotación. En los ejemplares más adelantados ya se observan **brotes principales de aproximadamente 30 cm de longitud** (más avanzados en el norte y este Santafesino). Sin embargo, se presenta una **marcada desuniformidad tanto entre variedades como dentro de una misma variedad**, con diferencias importantes entre individuos.
- Los mayores retrasos se observaron principalmente hacia el oeste y en algunos sectores del sur provincial, donde recientemente comenzaron a activarse

variedades de mayor requerimiento de frío. Esta heterogeneidad en la brotación será un aspecto a seguir durante las próximas semanas, particularmente por su incidencia sobre la uniformidad del desarrollo vegetativo y la posterior expresión reproductiva.

- Con el avance de la brotación comenzaron a realizarse **labores de desbrote y selección de estructuras vegetativas, especialmente en plantaciones jóvenes**. En numerosos lotes se están eliminando brotes provenientes de yemas basales o de posiciones poco convenientes, comúnmente identificadas como “yemas basura”, que compiten con las estructuras seleccionadas para conformar la arquitectura definitiva de la planta.
- En las plantas jóvenes también se observa una selección más precisa del eje central y de las futuras ramas estructurales o cargadoras, buscando orientar desde etapas tempranas el desarrollo de la copa y evitar una distribución excesivamente densa de brotes.
- Estas labores adquieren particular importancia durante esta etapa debido a la elevada capacidad de respuesta vegetativa del pecán una vez iniciada la brotación, permitiendo intervenir tempranamente sobre la estructura de las plantas.
- Durante los primeros días de septiembre todavía se identificaron algunos lotes donde se continuó realizando poda. Se trató de situaciones puntuales y minoritarias, correspondientes principalmente a establecimientos que habían quedado retrasados durante el invierno debido a las dificultades operativas registradas en los meses anteriores.
- Desde el punto de vista fisiológico, estas intervenciones resultaron poco aconsejables una vez iniciada la actividad vegetativa, por lo que se considera importante evitar que esta situación se generalice en futuras campañas. **La presencia de movimiento de savia y el comienzo de la brotación indican que la planta ya se encuentra transitando activamente hacia la nueva etapa de crecimiento.**
- Con el inicio del ciclo productivo también comenzaron a generalizarse las **labores básicas de mantenimiento de los montes**. Entre ellas se destaca el **control de malezas**, destinado a reducir la competencia temprana por agua y nutrientes, particularmente importante durante las primeras etapas de crecimiento.
- Otro de los principales focos de atención durante este período corresponde a las **hormigas podadoras**. Se ha observado una actividad elevada en numerosos establecimientos y, en algunos lotes, ya se registraron daños sobre los brotes recientemente desarrollados. La problemática resulta particularmente relevante en plantaciones jóvenes, donde una defoliación temprana puede afectar significativamente el establecimiento y crecimiento de las plantas.
- En los lotes más adelantados y en aquellos que cuentan con un seguimiento técnico intensivo **ya se han iniciado algunas estrategias de nutrición foliar.**

Entre las primeras intervenciones se destaca la aplicación de zinc, principalmente orientada a acompañar el crecimiento inicial y prevenir situaciones de deficiencia durante la etapa de expansión foliar.

- La oportunidad de estas aplicaciones se encuentra estrechamente relacionada con el grado de desarrollo alcanzado por cada plantación, por lo que se observa cierta variabilidad en el momento de inicio entre establecimientos y variedades.
- Hasta el momento, **no se observa una presencia significativa de enfermedades patogénicas** en las plantaciones relevadas. La ausencia de síntomas relevantes durante esta primera etapa resulta favorable, aunque deberá mantenerse un monitoreo permanente.
- **Las condiciones de humedad que presenta actualmente gran parte de la provincia generan un escenario potencialmente favorable para el desarrollo de determinados patógenos a medida que aumente la superficie foliar.** Por este motivo, se considera que la presente campaña podría requerir una atención sanitaria especialmente cuidadosa, particularmente en lotes con antecedentes de enfermedades y en aquellos con menor aireación de copa.
- El seguimiento deberá intensificarse a medida que avance la brotación y se incrementen simultáneamente la superficie foliar, la humedad relativa y la frecuencia de eventos de precipitación.
- Uno de los aspectos más favorables observados durante septiembre es la **buena disponibilidad de humedad en el perfil del suelo** en prácticamente toda la provincia. Esta situación permitió que, en la mayoría de las plantaciones funcionales, todavía no haya sido necesario iniciar de manera generalizada los ciclos de riego.
- No obstante, se mantiene la recomendación de **monitorear periódicamente** la humedad del perfil, especialmente en los lotes de mayor demanda y en aquellos sectores donde las características del suelo o del sistema de riego puedan limitar la disponibilidad efectiva de agua.
- En plantaciones recientemente implantadas sí se comenzaron a realizar tareas de repaso y puesta a punto de los sistemas de riego, principalmente con carácter preventivo, de manera de asegurar su correcto funcionamiento ante el incremento de la demanda hídrica que acompañará el crecimiento vegetativo durante las próximas semanas.
- **Septiembre marca el comienzo efectivo de una nueva campaña para las plantaciones de pecán de Santa Fe.** El ciclo se inicia con una brotación más tardía y heterogénea que en años anteriores, probablemente condicionada por la persistencia de temperaturas nocturnas bajas durante el período de transición invierno-primavera.
- Las condiciones hídricas actuales son, en términos generales, favorables, con perfiles de suelo bien provistos de humedad y una baja necesidad de utilización

de los sistemas de riego. Esto constituye un escenario positivo para acompañar el desarrollo vegetativo inicial, aunque será necesario monitorear la evolución de las condiciones ambientales durante las próximas semanas.

- **La prioridad de manejo se encuentra actualmente concentrada en acompañar y ordenar la brotación, controlar malezas y hormigas, seleccionar estructuras en plantas jóvenes, iniciar oportunamente la nutrición y mantener un seguimiento sanitario preventivo.** La evolución de la temperatura y de las precipitaciones durante octubre será determinante para definir el ritmo de crecimiento y las necesidades de intervención del cultivo.

5) **TUCUMÁN – CHACO – OESTE DE CÓRDOBA – JUJUY** – Ing. Agr. Enrique Orell

- **Tucumán:**

- En general en la zona estamos en elongación de amentos en protandrias y aparición de las primeras flores en protoginias. En uno de los campos pudimos ver liberación de polen en Starking, y estamos a 3-4 días que comience la liberación de polen Pawnee y Cape Fear, además de Harris Super y Western.
- Los perfiles de humedad son muy buenos, siempre por encima del 80 % de agua útil; las brotaciones en las variedades, en general, muy buenas.

- **Chaco:**

- Brotación muy despareja, con Cape Fear en brotación y desarrollo de primordios florales, y el resto de las variedades en comienzo de brotación. Parejos los perfiles de humedad y de sanidad; venimos muy bien.

- **Jujuy:**

- En plena floración y brotación, las plantaciones vienen muy bien.

- **Oeste de Córdoba:**

- Brotación en las variedades más tempranas. Buena acumulación de horas frío en invierno por lo que se espera una brotación pareja y uniforme. Regando para mantener perfil húmedo lo que sea necesario. Temperaturas medias bajas durante gran parte del mes y ahora subiendo sobre el final

6) **SALTA** – Ing. Agr. Humberto Álvarez Sierra

- **La brotación se adelantó 15/20 días** con respecto al año pasado, empezó a fines de agosto en las variedades más tempranas como Shoshoni, luego, con unas semanas de temperaturas bajas freno y las tasas de crecimiento fueron menores en los primeros días de septiembre.

- Actualmente, en plena floración, se ve muy **buena sincronización** entre variedades protándricas y protoginicas, y en general, tanto la brotación como la floración fueron muy parejas, compacta entre variedades.
- Con respecto al riego, se está manteniendo los perfiles cargados.

Conclusiones y consideraciones finales

Ya comenzó una nueva temporada de crecimiento del pecan en Argentina encontrándonos desde plena floración en el Norte Argentino hasta inicios de brotación en las zonas productoras más al Sur.

Se avecina una temporada donde la correcta gestión de las consecuencias que traerá el tan anunciado evento Niño y el manejo preciso de las herramientas agronómicas marcaran el resultado final.

Este Niño puede traer desde eventos de sequía en algunas zonas hasta excesos hídricos muy marcados en la generalidad por lo que es previsible que en la zona central al menos las enfermedades serán uno de los problemas a enfrentar. También será clave el manejo nutricional ya que las ventanas de aplicación serán escasas y se puede disminuir mucho la eficiencia de uso de los fertilizantes más que nada de los nitrogenados.

Esto sucede en un contexto donde las ventas se han frenado y muchos productores tienen problemas en la colocación de su producción lo que lleva como consecuencia a tener problemas de caja para enfrentar los gastos de esta temporada y es probable que no puedan ejecutarse los planes tal como fueron previstos.

NOTA:

Agradecemos a Mariano Marcó por coordinar este trabajo y a Diego Rodríguez, Darío Taiarol, Federico Debona, Walter Silva, Nicolás Huespe, Enrique Orell, Humberto Álvarez Sierra, Martín Basso y Carolina Holzheier que colaboraron compartiendo la información de las zonas productivas donde son referentes.